

## ONDE OCORRE?

- A doença já está presente em vários países que fazem fronteira com o Brasil, como a Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela e recentemente foi encontrada no Brasil, nos Estados do Acre e Amazonas.

## MEDIDAS PARA EVITAR A ENTRADA DA MONILÍASE

- Caso pretenda viajar para estes locais, não traga, na volta, nenhum material das espécies de plantas atacadas por essa doença, assim você obedece a lei e colabora com os produtores de cacau e cupuaçu do estado de Rondônia.



**Vamos proteger o cacau e o cupuaçu de Rondônia!**



## IDARON

Agência de Defesa Sanitária  
Agrosilvopastoril de Rondônia

## SEAGRI

Secretaria de Estado da  
Agricultura



Governo do Estado de  
**RONDÔNIA**

Saiba mais:

[www.idaron.ro.gov.br](http://www.idaron.ro.gov.br)

se conecte com a IDARON

   /idaronrondonia



# MONILÍASE

## do cacauero

*Moniliophthora roreri*

Não transporte frutos, amêndoas ou mudas de cacau e cupuaçu sem autorização da Idaron.

# IDARON

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL  
DO ESTADO DE RONDÔNIA



## MONILÍASE

- A monilíase do cacau e do cupuaçuzeiro é uma séria doença causada pelo fungo *Moniliophthora roreri*. A doença pode afetar até 100% da produção. Ocorre em todas as fases do desenvolvimento do fruto, mas principalmente no início.

## SINTOMAS

- O fungo ataca somente os frutos do cacau, cupuaçu e outras plantas do gênero *Theobroma* como o cacauí e o cupuí. Os sintomas iniciais da doença destacam-se pelo escurecimento dos frutos. A partir daí, em poucos dias, ocorre a formação de uma grande quantidade de pó branco que é o esporo do fungo.

Fonte: MAPA



Sintomas de monilíase em frutos de cupuaçu e cacau.

## DISSEMINAÇÃO

- A massa branca de esporos do fungo *Moniliophthora roreri* é facilmente levada pelo vento, animais, respingos de chuva ou de um fruto doente para um sadio. Porém, o homem é o principal disseminador da doença, quando transporta frutos doentes de uma área infestada para áreas livres. Os esporos do fungo podem sobreviver tanto no solo quanto em frutos velhos, amêndoas, sacarias e roupas infestadas.

## O QUE FAZER EM UM FOCO SUSPEITO DA DOENÇA?

- Ao encontrar frutos de cacau e cupuaçu com sintomas suspeitos de monilíase, não mexa nos frutos, isole a área e contate a Idaron do seu município, através dos contatos disponíveis no site ([www.idaron.ro.gov.br](http://www.idaron.ro.gov.br)), ou disque Idaron **0800 643 4337**.

Não dissemine a doença.



Fotos: Amauri Siviero



Sintomas externos e internos da monilíase em cacau.

DIGA NÃO À MONILÍASE

Sintomas da monilíase no cupuaçu.