

A AGÊNCIA IDARON REALIZA UM TRABALHO PERMANENTE DE:

- Coleta de amostras para exames de animais suspeitos de raiva.
- Monitoramento de abrigos e captura de morcegos que se alimentam de sangue.

COMUNIQUE À IDARON A VACINAÇÃO DE SEU REBANHO CONTRA A RAIVA. INFORME SOBRE A EXISTÊNCIA DE ATAQUES DE MORCEGOS AOS ANIMAIS DE SUA PROPRIEDADE.



Foto: Secretaria da Agricultura e Abastecimento - SP

Formas de notificar

- Entre em contato com uma unidade da Idaron
- www.idaron.ro.gov.br - Notificação de doenças



Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia

SEAGRI

Secretaria de Estado da Agricultura



Governo do Estado de **RONDÔNIA**



Saiba mais:

www.idaron.ro.gov.br

se conecte com a IDARON




/idaronrondonia



RAIVA

Uma ameaça para a saúde dos animais e do homem.



Comuniquem à Idaron a morte ou existência de animais suspeitos de raiva

O QUE É RAIVA?

A raiva é uma doença causada por um vírus que ataca bovinos, búfalos, cavalos, burros, jumentos, mulas, cabritos, ovelhas, porco, animais selvagens, cães e gatos, podendo ser transmitida ao homem.

COMO A RAIVA É TRANSMITIDA AOS ANIMAIS?

Os morcegos hematófagos (morcegos que se alimentam de sangue) portadores da raiva, ao morderem as criações, transmitem o vírus presente em sua saliva.

Outra forma de transmissão menos comum é a agressão por cães, gatos e animais selvagens contaminados.

COMO O HOMEM CONTRAI A RAIVA?

O homem contrai a raiva pela saliva de um animal doente, sendo a mordedura a forma mais comum de contaminação, como também através de arranhões e lambidas em ferimentos na pele ou nas mucosas da boca, nariz e olhos.



VOCÊ PODE AJUDAR A CONTROLAR A RAIVA. VACINE ANUALMENTE SEUS ANIMAIS CONTRA A RAIVA.

SINAIS E SINTOMAS

Quando os bovinos ou os equídeos (cavalo, burro, Jumento, mula) estão doentes, os principais sintomas são:

- O animal se isola do restante do rebanho
- O animal aparenta estar com sono
- O animal aparenta estar engasgado
- O animal baba intensamente
- Pode apresentar agressividade
- Dificuldade de urinar e defecar
- Andar cambaleante
- Paralisia da parte traseira
- Cai e tem dificuldade de levantar
- Movimento de pedalagem das pernas quando caído
- Na maioria das vezes, a morte ocorre entre o terceiro e o sexto dia após o início dos sintomas
- Pode haver restos de sangue no pêlo do animal, ou até um pequeno ferimento indicando o local onde o morcego mordeu

COMO VOCÊ PODE AJUDAR NO COMBATE A RAIVA

- Vacine anualmente todos os bovinos, equinos, asininos, muare, ovinos e caprinos contra a raiva;
- Quando o animal for vacinado contra raiva pela primeira vez na vida, deverá receber um reforço com trinta dias após a primeira dose
- Declare à Agência IDARON a vacinação dos animais
- Comunique à Agência IDARON a existência de abrigos de morcegos (cavernas, bueiros, ocos de árvores, casas abandonadas) e a ocorrência de ataques de morcegos aos animais
- Fazer o uso de pasta vampiricida nas mordeduras provocadas por morcegos hematófagos, com orientação de um médico veterinário
- Não toque em animais suspeitos e comunique à Agência IDARON a existência ou a morte de animais com sintomas de raiva
- Toda pessoa que for mordida, arranhada, ou tiver algum contato com animais suspeitos de raiva, deve lavar o ferimento com água e sabão e procurar imediatamente o posto de saúde mais próximo.

